

## SC/ -His/-Leu/-Trp 产品说明书

### ● 产品规格和内容:

包装名称	货号	包装含量	数量	保存条件/时间
SC/-His/-Leu/-Trp Broth	CAT# : YM4300L-01	3.7g (可配 0.5L SC/-His/-Leu/-Trp 液体培养基)	5 袋	室温干燥/24 个月
SC/-His/-Leu/-Trp Broth	CAT# : YM4300L-02	3.7g (可配 0.5L SC/-His/-Leu/-Trp 液体培养基)	10 袋	室温干燥/24 个月
SC/-His/-Leu/-Trp with Agar	CAT# : YM4300S-01	13.7g (可配 0.5L SC/-His/-Leu/-Trp 固体培养基)	5 袋	室温干燥/24 个月
SC/-His/-Leu/-Trp with Agar	CAT# : YM4300S-02	13.7g (可配 0.5L SC/-His/-Leu/-Trp 固体培养基)	10 袋	室温干燥/24 个月

### ● 产品组分与配方:

产品组分	SC/-His/-Leu/-Trp Broth 配方/L	SC/-His/-Leu/-Trp with Agar 配方/L
YNB(无氨基酸)	6.7g	6.7g
DO Supplement -His/-Leu/-Trp	0.62g	0.62g
Agar		20g

### ● PH 值( 25°C ): 5.8 ± 0.1

### ● 产品说明

SC 是一种不含碳源的酵母筛选用培养基, 由 YNB(无氨基酸)和氨基酸混合物(DO Supplement)混合而成; 不含葡萄糖等任何一种碳源, 实验者可根据试验需要添加葡萄糖, 半乳糖, 棉子糖, 果糖, 蔗糖等作为酵母碳源使用。另外 SC 也是一种由确定成分组成的全合成酵母培养基。SC/-His/-Leu/-Trp 只缺失 L-组氨酸、L-亮氨酸、L-色氨酸, 含有除 L-组氨酸、L-亮氨酸、L-色氨酸外的 8 种必需氨基酸和腺嘌呤, 尿嘧啶, 广泛应用于酵母互作和酵母离子耐受, 功能互补及各种野生型酵母, 部分突变型酵母的鉴定、筛选和培养试验。

### ● 使用方法

SC/-His/-Leu/-Trp Broth 为 SC/-His/-Leu/-Trp 液体培养基, 取 SC/-His/-Leu/-Trp Broth 培养基一袋, 加蒸馏水 450ml 搅拌溶解后, 定容到 0.5L(不用调 pH 值), 121°C-15min 高压灭菌, 灭菌后补加适量碳源, 温度降到 30 度以下使用。

SC/-His/-Leu/-Trp with Agar 为 SC/-His/-Leu/-Trp 固体培养基, 取 SC/-His/-Leu/-Trp with Agar 培养基一袋, 加蒸馏水 450ml 溶解(Agar 不溶), 定容到 0.5L(不用调 pH 值), 121°C-15min 灭菌, 灭菌后补加适量碳源, 温度降到 55 度以下倒平板即可。

### ● 注意事项

1. 若发现有严重吸潮现象, 停止使用或酌情增加用量。若配制少于 0.5L, 按比例加入即可。
2. 葡萄糖可以 121°C-15min 或 115°C-20min 灭菌, 灭菌后培养基颜色偏棕黄色, 对酿酒酵母生长影响不大(高温会使葡萄糖发生美拉德反应, 美拉德反应亦称非酶棕色化反应, 是羰基化合物(还原糖类)和氨基化合物(氨基酸和蛋白质)间的反应, 经过复杂的历程最终生成棕色甚至黑色的的大分子物质拟黑素)。